

ターナー症候群について

病名	病気の症状や対応について	難病の団体・HP
<p>ターナー症候群</p> <p>ターナー症候群（性器発育異常）では、女兒は2本のX染色体のうち1本が部分的あるいは完全に欠けている状態で生まれてきます。</p>	<p>◇症状</p> <p>・ターナー症候群を伴う新生児の多くは、手の甲と足の上部が腫れています（リンパ水腫）。首の後ろに腫れや皮膚のたるみが明らかに認められることもよくあります。そのほかにも、翼状頸（首と肩の間に広く皮膚がついている）、首の後ろの髪の毛の生えざわが低い位置にある、胸が広く乳首と乳首の間が広い、爪の発達が悪いなどの症状が現れます。</p> <p>ターナー症候群の女兒が成長すると、生理がなく（無月経）、胸、膣（ちつ）、陰唇が普通は思春期に起こる変化に比べ子供のような状態のままであることなどがみられます。卵巣には通常、発達している卵がありません。ターナー症候群の女兒や女性は、必ずといっていいほど低身長です。肥満もよくみられます。</p> <p>ターナー症候群の女兒の多くは、視覚と空間の関係を把握することが困難で、計画性と注意力に問題がみられます。これらの子供は言語の知能テストでは平均かそれ以上の成績をとっても、ある種の能力テストや数学では成績が低い傾向があります。精神遅滞はあまりみられません。</p> <p>（メルクマニユアル医学百科：HPより）</p>	<p>ひまわりの会</p> <p>http://www.osaka-himawari.com/course/13.html</p>